

《中药注射剂应用手册》

图书基本信息

书名：《中药注射剂应用手册》

13位ISBN编号：9787509163832

10位ISBN编号：7509163838

出版时间：2013-3

出版社：人民军医出版社

页数：252

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《中药注射剂应用手册》

前言

中药注射剂是以中医药理论为指导，采用现代技术从中药的单方或复方中提取有效成分制成的无菌制剂，与传统中药剂型相比，具有生物利用度高、作用迅速等特点，在疾病治疗中发挥着重要的作用。随着中药注射剂的广泛应用，用药安全越来越受到关注。护士既是临床用药的实施者，又是用药过程的观察者。护士在安全用药的环节中，起着十分重要的作用。本书通过规范78种临床常用中药静脉注射剂的使用，结合《中华人民共和国药典》、药品说明书，对中药静脉注射剂的药物成分、pH、配伍、给药方法、中西药相互作用等方面进行了梳理，着重突出中药静脉注射剂临床应用的规范性、实用性，对临床药师和护理工作有一定的指导作用。参与本书编写的人员均为临床护理专家和护理骨干，编写时力求突出简明、实用、可操作性。随着中药静脉注射剂制作工艺的改善、剂型的变化以及输注工具的不断更新，编者虽竭力收集整理，本书尚难概全，对书中存在的不足或疏漏之处，敬请广大读者不吝指正。

《中药注射剂应用手册》

内容概要

《中药注射剂应用手册》收集临床常用中药静脉注射剂，包括清热类、活血类、补益类、抗肿瘤类、其他类及中药来源的静脉注射剂，从药物概况、配伍禁忌、配药护理和用药护理4个方面进行了论述，重点讲解了临床使用注射剂时的安全措施。

书籍目录

第1章清热类中药静脉注射剂 一、穿心莲注射液 二、苦黄注射液 三、莲必治注射液 四、清开灵注射液 五、热毒宁注射液 六、射干抗病毒注射液 七、舒肝宁注射液 八、双黄连注射液 附1：注射用双黄连（冻干） 九、痰热清注射液 十、喜炎平注射液 十一、醒脑静注射液 十二、茵栀黄注射液 十三、鱼腥草注射液 第2章活血类中药静脉注射剂 一、丹红注射液 附1：丹红滴注射液 二、丹参注射液 附1：注射用丹参粉针 附2：丹参滴注射液 附3：复方丹参注射液 三、丹香冠心注射液 四、灯盏花素注射液 附1：注射用灯盏花素（粉针） 五、灯盏细辛注射液 六、冠心宁注射液 七、红花注射液 八、苦碟子注射液 九、脉络宁注射液 十、舒血宁注射液 十一、疏血通注射液 十二、香丹注射液 十三、血必净注射液 十四、血塞通注射液 附录1：注射用血塞通（冻干） 十五、血栓通注射液 附1：注射用血栓通（冻干） 十六、注射用丹参多酚酸盐 十七、注射用红花黄色素 附1：红花黄色素氯化钠注射液 第3章补益类中药静脉注射剂 一、黄芪注射液 二、参麦注射液 三、参附注射液 四、参芪扶正注射液 五、生脉注射液 六、肾康注射液 七、注射用黄芪多糖 八、注射用脑心康 第4章抗肿瘤类中药静脉注射剂 一、艾迪注射液 二、蟾酥注射液 三、复方苦参注射液 四、华蟾素注射液 五、康艾注射液 六、康莱特注射液 附1：注射用薏苡仁油注射液 七、消癌平注射液 八、鸦胆子油乳注射液 第5章其他中药静脉注射剂 一、刺五加注射液 二、复方半边莲注射液 三、复方麝香注射液 四、瓜蒌皮注射液 第6章中药来源的静脉注射剂 一、川芎嗪注射液 附1：盐酸川芎嗪注射液 附2：磷酸川芎嗪注射液 附3：注射用盐酸川芎嗪 附4：注射用磷酸川芎嗪 附5：盐酸川芎嗪葡萄糖注射液 附6：磷酸川芎嗪葡萄糖注射液 附7：盐酸川芎嗪氯化钠注射液 附8：磷酸川芎嗪氯化钠注射液 二、大蒜素注射液 附1：大蒜素葡萄糖注射液 三、丹参酮 A 磺酸钠注射液 四、多西他赛注射液 附1：注射用多西他赛 五、莪术油注射液 附1：莪术油葡萄糖注射液 六、甘草酸二铵注射液 七、高三尖杉酯碱注射液 附1：高三尖杉酯碱粉针 八、葛根素注射液 附1：注射用葛根素（粉针） 附2：葛根素氯化钠注射液 附3：葛根素葡萄糖注射液 九、苦参碱注射液 附1：苦参碱注射（粉针） 附2：苦参碱葡萄糖注射液 附3：苦参碱氯化钠注射液 十、苦参素注射液 附1：苦参素注射粉针 十一、苦参总碱注射液 十二、榄香烯注射液 十三、亮菌甲素注射液 附1：亮菌甲素注射粉针 十四、羟喜树碱注射液 十五、曲克芦丁注射液 附1：注射用曲克芦丁 附2：曲克芦丁氯化钠注射液 附3：曲克芦丁葡萄糖注射液 十六、去甲斑蝥酸钠注射液 附1：注射用去甲斑蝥酸钠 十七、替尼泊苷注射液 十八、天麻素注射液 十九、细辛脑注射液 附1：注射用细辛脑 二十、香菇多糖注射液 附1：香菇多糖注射粉针 二十一、炎琥宁氯化钠注射液 附1：注射用炎琥宁 二十二、依托泊苷注射液 二十三、藻酸双酯钠注射液 附1：藻酸双酯钠氯化钠注射液 附2：藻酸双酯钠注射粉针 二十四、注射用硫酸长春地辛 二十五、注射用硫酸长春碱 二十六、注射用硫酸长春新碱 二十七、注射用七叶皂苷钠 二十八、紫杉醇注射液 附1：注射用紫杉醇 附2：注射用紫杉醇脂质体

章节摘录

版权页：（3）年老体弱者、儿童、孕妇、心肺严重疾患、肝肾功能异常者，加强安全用药监护。

（4）生脉注射液引起的不良反应主要为变态反应。表现为过敏性休克、皮疹、腹泻、药物热、重度眼睑水肿、角膜水肿，视物不清、急性肝损害、窦性停搏、腰背剧痛、低血压等症状。（5）输液过程中，如出现混浊、沉淀、变色、漏气或瓶身细微破裂等与说明书外观性状不符的情况，不能使用。

4.护理（1）发生不良反应时立即停药，更换输液管路，保留静脉通路，通知医师。（2）发生不良反应时应明确告知患者及家属其对本品过敏，避免再次用药。（3）发生不良反应时应封存药液及管路，按照药物不良反应报告流程送检。（4）用药期间和过敏反应治疗期间，宜清淡饮食，禁辛辣、油腻、食鱼腥发物。（5）注意对患者的心理疏导，减轻其心理负担。

六、肾康注射液（一）基本概况

1.成分大黄、黄芪、丹参、红花。2.性状本品为黄棕色的澄明液体。3.功效主治 降逆泄浊、益气活血、通腑利湿。适用于慢性肾衰竭属湿浊血瘀证。症见：恶心、呕吐、口中黏腻、面色晦暗、身重困倦、腰痛、纳呆、腹胀、肌肤甲错、肢体麻木、舌质紫暗或有瘀点、舌苔厚腻、脉涩或细涩。4.贮藏方法密闭、遮光、置阴凉处保存（不超过20℃）。（二）配伍禁忌 1.参照药物说明书。2.不宜与藜芦中药合用。3.本品与盐酸左氧氟沙星注射液配伍，易生成红棕色絮状混浊。（三）配药护理 1.现用现配 配制好的药液放置时间过长，影响药品质量，应现用现配。2.本品宜单独使用 不宜与其他药物在同一容器中混合使用。3.使用间隔液输入肾康注射液前后，如使用与其存在配伍禁忌的药物时，应用间隔液冲洗管路。4.药品应使用同一厂家、同一批号、有效期内的药品。5.溶媒 以10%葡萄糖注射液为宜。6.配药注意事项（1）配制药液应在室温条件下进行。（2）严格遵循配制浓度，配药注射器一人一药一用。（3）配药注射器针头应全部浸入液体中推注药液，以减少气泡产生。

《中药注射剂应用手册》

编辑推荐

《中药注射剂应用手册》内容简明、扼要，便于记忆，突出实用性、规范性，是临床护理人员、特别是中医护士必备的参考用书。

《中药注射剂应用手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com